



Prueba para tratar: Cómo comenzar con Molnupiravir

Posibles efectos secundarios de molnupiravir

- Reacciones alérgicas. Pueden presentarse reacciones alérgicas graves (conocidas como anafilaxia), incluso después de una sola dosis. Deje de tomar molnupavir y llame a su proveedor de cuidados de la salud de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas: *dificultad para tragar o respirar, hinchazón de la boca, los labios o la cara, opresión en la garganta, ronquera, erupción cutánea repentina o urticaria.*
- Otros posibles efectos secundarios. Algunos de los más frecuentes son *náuseas, diarrea y mareos.* Estos pueden ser normales y no necesariamente un motivo para dejar de tomar molnupiravir. Comuníquese con su proveedor de cuidados de la salud si experimenta algún síntoma que le preocupe.

Cómo cuidar de usted mismo o de un familiar con la COVID-19

- Los cuidados de soporte incluyen reposo, hidratación y nutrición. Hable con su médico sobre otros tratamientos que pueden aliviar sus síntomas (es decir, dolores de cabeza, dolores musculares, fiebre y tos) mientras se recupera de la COVID-19.
- Usted sigue siendo contagioso; permanezca aislado de acuerdo con sus pautas locales, use tapabocas si debe estar cerca de otras personas y lávese las manos con frecuencia para reducir la propagación de la COVID-19. Hable con su equipo de atención médica si tiene preguntas sobre el aislamiento y/ola cuarentena.
- La vacunación es la forma más eficaz de reducir el riesgo de infección y progresión a enfermedad grave, hospitalización y muerte. Póngase la vacuna y/o el refuerzo si aún no lo ha hecho.

BANDERAS ROJAS: incluso si está tomando molnupavir, busque atención médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas de emergencia: empeoramiento de la disnea o falta de aire, dolor en el pecho intenso y constante, debilidad intensa, confusión o letargo.

Información de contacto:

Mi equipo de atención médica: _____

Mi atención de emergencia más cercana: _____

Este trabajo fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es responsabilidad del proyecto EpiC y no necesariamente refleja las opiniones de la USAID o el gobierno de los Estados Unidos. EpiC es un acuerdo cooperativo global (7200AA19CA00002) liderado por FHI 360 con los socios principales Right to Care, Palladium International y Population Services International (PSI).

La prueba para tratar es una estrategia que vincula a los pacientes sintomáticos con las pruebas, el diagnóstico y la atención basada en la evidencia para la COVID-19, incluido el uso de antivirales orales para pacientes elegibles.

¿Qué es molnupiravir? El molnupiravir es un nuevo medicamento antiviral oral que se usa para tratar la COVID-19 de leve a moderada.

¿Quién puede tomar molnupiravir? Adultos (de 18 años o más) con un resultado positivo en la prueba de detección del SARS-CoV-2 dentro de los cinco días de la aparición de los síntomas y que tienen un riesgo alto de progresión a la COVID-19 grave, incluidas hospitalización o muerte.

Se le ha entregado esta hoja informativa porque su proveedor de cuidados de la salud considera que es beneficioso darle el medicamento antiviral oral denominado Paxlovid para el tratamiento de la enfermedad de leve a moderada por el coronavirus (COVID-19) causada por el virus SARS-CoV-2. Esta hoja contiene información que le puede ayudar a comprender los riesgos y beneficios de tomar molnupavir, que usted recibe o puede recibir. Explica cómo tomar el molnupiravir y cómo informar efectos secundarios o problemas con el aspecto o el envase. Hable con su proveedor de cuidados de la salud si tiene alguna pregunta.

El molnupiravir ha recibido la autorización de uso de emergencia por parte de la FDA en los Estados Unidos, y la Organización Mundial de la Salud lo recomienda como tratamiento para la COVID-19. El molnupiravir se considera en investigación porque aún se está estudiando. La información sobre la seguridad y la efectividad del uso de molnupavir para tratar a personas con la COVID-19 de leve a moderada es limitada, pero los datos disponibles lo respaldan como tratamiento recomendado.

Cosas que debe informar a su proveedor de atención médica antes de comenzar a recibir molnupiravir

- Todos los medicamentos, suplementos, medicamentos a base de hierbas o vitaminas que esté tomando actualmente o que deba tomar.
- Cualquier enfermedad grave o crónica.
- Cualquier alergia.
- Si está embarazada o puede quedar embarazada.
- Si está en periodo de lactancia.

Si respondió "sí" a alguna de estas afecciones, informe a su proveedor de cuidados de la salud. Aún puede recibir tratamiento para la COVID-19. Hay más información dentro de este documento.

Recomendaciones basadas en la hoja [informativa para pacientes y cuidadores](#), autorización de uso de emergencia (EUA) de LAGEVRIO™ (molnupavir) en cápsulas para la enfermedad por el coronavirus (COVID-19), Merck & Co. Inc.; Revisado: Junio de 2022.



¿Cómo tomo el molnupiravir?

- Tome cuatro cápsulas de molnupiravir cada 12 horas (por ejemplo, a las 8 A. M. y a las 8 P. M.).
- Tome el molnupiravir durante cinco días. Es importante tomar los cinco días completos de tratamiento. No deje de tomar el molnupiravir antes de los cinco días completos, incluso si se siente mejor.
- Tome el molnupiravir con o sin alimentos.
- Trague las cápsulas enteras. No abra, rompa ni triture las cápsulas. Si no puede tragar las cápsulas enteras, informe a su proveedor de cuidados de la salud.

Consejos para tomar molnupiravir

Qué hacer si omite una dosis: si pasaron menos de 10 horas desde la dosis omitida, tómela tan pronto como lo recuerde. Si pasaron más de 10 horas desde la dosis omitida, salte la dosis omitida y tome la dosis en el siguiente horario programado. No duplique la dosis de molnupiravir para compensar una dosis omitida.

Hable con su proveedor de cuidados de la salud si no se siente mejor o si se siente peor después de 5 días. Si se siente mejor, pero luego comienza a sentirse peor nuevamente en cualquier momento después de finalizar el curso de molnupiravir, hable con su proveedor de cuidados de la salud y repítase la prueba de la COVID-19.

Cómo almacenar el molnupiravir

Almacene las cápsulas a temperatura ambiente, entre 20 °C y 25 °C. Mantenga el molnupiravir y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Si tiene inquietudes sobre el aspecto del empaque o los comprimidos, o si tiene inquietudes sobre posibles efectos secundarios o interacciones con medicamentos, comuníquese con el proveedor de cuidados de la salud o el centro donde se le recetó el molnupiravir.



800 mg (o CUATRO
CÁPSULAS DE 200 mg)

Imágenes de la cápsula con fines ilustrativos únicamente.



TÓMESE POR VÍA ORAL
CADA 12 HORAS



DURANTE 5 DÍAS



CON O SIN ALIMENTOS

¿Quién generalmente no debe tomar molnupiravir?

- Personas alérgicas a cualquier ingrediente de molnupiravir.
- Mujeres embarazadas, que planean quedar embarazadas o están amamantando.
- Personas que no están en riesgo de enfermedad grave, hospitalización o muerte relacionada con la COVID-19.
- Personas que toman ciertos medicamentos.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre molnupiravir?

No se recomienda el uso de molnupiravir durante el embarazo.

Se desconoce si molnupiravir le causará daño a su bebé si se toma durante el embarazo. El molnupiravir no ha sido estudiado en el embarazo humano. Cuando se estudió en animales preñados, molnupiravir le causó daño a los bebés en gestación.



Para las personas que pueden quedar embarazadas:

- Use un método anticonceptivo confiable (anticoncepción) de manera constante y correcta durante el tratamiento con molnupiravir y durante cuatro días después de la última dosis. Hable con su proveedor de cuidados de la salud sobre los métodos anticonceptivos confiables.
- Antes de comenzar el tratamiento con molnupiravir, es posible que su proveedor de cuidados de la salud le haga una prueba de embarazo para determinar si está embarazada. *Informe a su proveedor de cuidados de la salud de inmediato si queda embarazada o cree que puede estar embarazada durante el tratamiento con molnupiravir.*
- *No se recomienda amamantar durante el tratamiento con molnupiravir y durante cuatro días después de la dosis final.* Una persona en período de lactancia puede considerar interrumpir la lactancia y extraerse y desechar la leche materna durante el tratamiento y durante cuatro días después de la última dosis.

En el caso de los hombres sexualmente activos con parejas que pueden quedar embarazadas:

- Se desconoce si molnupiravir puede afectar los espermatozoides. Si bien el riesgo se considera bajo, no se han hecho estudios en animales para evaluar a fondo si es posible que el molnupiravir afecte a los bebés de hombres tratados con este agente. Debe usar un método anticonceptivo confiable (anticoncepción) de manera constante y correcta durante el tratamiento con molnupiravir y durante tres meses después de la última dosis. Hable con su proveedor de cuidados de la salud si tiene preguntas o inquietudes sobre los métodos anticonceptivos o sobre cómo el molnupiravir puede afectar los espermatozoides.