

Effets secondaires importants possibles de Paxlovid

- **Réactions allergiques.** Des réactions allergiques sévères (appelées « anaphylaxie ») peuvent survenir, même après une seule dose. Arrêtez de prendre du Paxlovid et appelez immédiatement votre professionnel(le) de santé si vous présentez l'un des symptômes suivants : difficultés à avaler ou à respirer ; gonflement de la bouche, des lèvres ou du visage ; serrement de la gorge ; enrouement ; éruption cutanée soudaine ou urticaire.
- **Problèmes hépatiques.** Informez immédiatement votre professionnel(le) de santé si vous présentez l'un de ces signes et symptômes de problèmes hépatiques : perte d'appétit, jaunissement de la peau et du blanc des yeux (jaunisse), urines foncées, selles pâles et démangeaisons cutanées, douleurs d'estomac/abdominales.
- **Les autres effets secondaires possibles et plus fréquents** comprennent une modification du goût, de la diarrhée/des nausées, une hypertension artérielle, des douleurs musculaires, des douleurs abdominales ou la sensation générale de ne pas aller bien. Ces effets secondaires peuvent être normaux et ne constituent pas nécessairement une raison d'arrêter de prendre du Paxlovid. Contactez votre professionnel(le) de santé si vous présentez des symptômes qui vous inquiètent.

Prendre soin de vous ou d'un membre de votre famille atteint de COVID-19

- Les soins de soutien comprennent le repos, l'hydratation et la nutrition. Discutez avec votre médecin des autres traitements qui peuvent soulager vos symptômes (c.-à-d. maux de tête, douleurs musculaires, fièvre et toux) pendant votre rétablissement de la COVID-19.
- Vous êtes toujours contagieux(-se) ; restez isolé(e) conformément aux directives locales, portez un masque si vous devez être à proximité d'autres personnes et lavez-vous les mains fréquemment pour réduire la propagation de la COVID-19.
- La vaccination est le moyen le plus efficace de réduire le risque d'infection et de progression en maladie grave, en hospitalisation et en décès. Faites-vous vacciner et/ou recevez un rappel si cela n'a pas déjà été fait.

AVERTISSEMENTS : même si vous prenez du PAXLOVID, consultez immédiatement un médecin si vous présentez l'un des signes ou symptômes d'urgence suivants : aggravation de la respiration ou essoufflement, douleur thoracique sévère et persistante, faiblesse sévère, confusion ou léthargie.

Coordonnées :

Mon équipe soignante : _____

Mes soins d'urgence les plus proches : _____

Ce travail a été rendu possible grâce au soutien généreux du peuple américain à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Le contenu est la responsabilité du projet EpiC et ne reflète pas nécessairement l'opinion de l'USAID ou du gouvernement des États-Unis. Le projet EpiC est une convention de coopération mondiale (7200AA19CA00002) sous la houlette de FHI 360 avec pour principaux partenaires Right to Care, Palladium International et Population Services International (PSI).

Test to Treat (Dépister et traiter) : Commencer le Paxlovid (comprimés de nirmatrelvir et de ritonavir)

Octobre | 2022

La stratégie « Test to Treat » (dépister et traiter) permet de relier les patients symptomatiques aux tests, au diagnostic et aux soins fondés sur des preuves pour la COVID-19, y compris l'utilisation d'antiviraux par voie orale pour les patients éligibles.

Vous avez reçu cette fiche d'information parce que votre professionnel(le) de santé estime qu'il est bénéfique de vous fournir le médicament antiviral oral appelé Paxlovid pour le traitement de la maladie à coronavirus (COVID-19) légère à modérée causée par le virus SARS-CoV-2. Cette fiche d'information contient des informations pour vous aider à comprendre les risques et les bénéfices de la prise de Paxlovid, que vous recevez ou pourriez recevoir. Elle explique comment prendre le Paxlovid et comment signaler les effets secondaires ou les problèmes d'aspect ou d'emballage. Adressez-vous à votre professionnel(le) de santé si vous avez des questions.

Le Paxlovid est fabriqué par Pfizer et a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA aux États-Unis. Le Paxlovid est expérimental car il est encore en cours d'étude. Il existe peu d'informations sur la sécurité d'emploi et l'efficacité de l'utilisation de Paxlovid pour traiter les personnes atteintes de COVID-19 légère à modérée, mais les données disponibles l'étaient comme traitement recommandé.

C'est à vous de décider si vous souhaitez ou non prendre le Paxlovid.

Qu'est-ce que le Paxlovid ? Le Paxlovid est un nouveau médicament antiviral oral utilisé pour traiter la COVID-19 légère à modérée. Il est fabriqué par Pfizer et a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence comme traitement pour la COVID-19 légère à modérée.

Qui peut prendre le Paxlovid ? Adultes et enfants (âgés de 12 ans et plus pesant au moins 40 kg) avec un résultat positif au test de dépistage du SARS-CoV-2, et qui présentent un risque élevé de progression vers une forme sévère de COVID-19, y compris une hospitalisation ou le décès.

Ce qu'il faut dire à votre professionnel(le) de santé avant de commencer à prendre le Paxlovid

- Tous les médicaments, compléments alimentaires, médicaments à base de plantes ou vitamines que vous prenez actuellement ou que vous devez prendre
- Toute maladie grave ou chronique
- Indiquer spécifiquement à votre prestataire de soins de santé si vous avez le VIH et, si oui, quels médicaments vous prenez
- Toute allergie
- Maladie hépatique ou rénale
- Grossesse en cours possible ou possibilité de débuter une grossesse
- Allaitement





Si vous avez répondu « oui » à l'un de ces états, dites-le à votre professionnel(le) de santé. Vous pouvez toujours être traité(e) pour la COVID-19. Voir à l'intérieur pour plus d'informations.

Recommandations basées sur la [fiche d'information destinée aux patients, aux parents et aux soignants](#) ; Autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de PAXLOVID pour la maladie à coronavirus (COVID-19) ; Pfizer, Inc. ; Révisé : 26 septembre 2022.

Comment prendre le Paxlovid ?

- Le **nirmatrelvir** est un comprimé ovale et rose. La plupart des personnes prennent deux comprimés (150 mg chacun ; 300 mg lorsqu'ils sont pris ensemble). Les personnes atteintes de problèmes rénaux ne prennent qu'un seul comprimé (150 mg) par dose. Adressez-vous à votre professionnel(le) de santé si vous êtes atteint(e) d'affections médicales sévères pour vous assurer de prendre la bonne dose.
- Le **ritonavir** est un comprimé ovale, blanc ou blanc cassé. Les personnes prennent un comprimé de ritonavir (100 mg) par dose.

Comment prendre LE PAXLOVID 300 mg ; boîte de doses de 100 mg

<p>PAXLOVID™ (comprimés de nirmatrelvir ; comprimés de ritonavir), conditionnés ensemble pour une utilisation orale 300 mg de nirmatrelvir ; 100 mg de ritonavir</p> <p>comprimé de nirmatrelvir (150 mg)</p> <p>Dose du matin Prenez 3 comprimés en même temps.</p>  <p>comprimé de nirmatrelvir (150 mg)</p> <p>comprimé de ritonavir (100 mg)</p>	<p>Dose du matin : Prenez 2 comprimés roses de nirmatrelvir et 1 comprimé blanc à blanc cassé de ritonavir ensemble à la même heure chaque soir.</p> 
<p>PAXLOVID™ (comprimés de nirmatrelvir ; comprimés de ritonavir), conditionnés ensemble pour une utilisation orale 300 mg de nirmatrelvir ; 100 mg de ritonavir</p> <p>comprimé de nirmatrelvir (150 mg)</p> <p>Dose du soir : Prenez 3 comprimés en même temps.</p>  <p>comprimé de nirmatrelvir (150 mg)</p> <p>comprimé de ritonavir (100 mg)</p>	<p>Dose du soir : Prenez 2 comprimés roses de nirmatrelvir et 1 comprimé blanc à blanc cassé de ritonavir ensemble à la même heure chaque soir.</p> 

Si vous êtes atteint(e) d'une maladie rénale avancée ou si votre professionnel(le) de santé décide que vous devez recevoir une dose plus faible, vous ne pouvez prendre qu'un seul comprimé de nirmatrelvir (150 mg) et un seul comprimé de ritonavir (100 mg) par dose.

Comment dois-je conserver le Paxlovid ?

Conservez les comprimés de Paxlovid à température ambiante, entre 20 °C et 25 °C.

Si vous avez des inquiétudes concernant l'apparence de l'emballage ou des comprimés, ou si vous avez des inquiétudes concernant des effets secondaires ou des interactions médicamenteuses possibles, contactez le ou la professionnelle de santé ou l'établissement où Paxlovid vous a été prescrit.

Conseils pour la prise de Paxlovid

Ne retirez pas les comprimés de Paxlovid de la plaquette thermoformée avant d'être prêt(e) à prendre votre dose. Prenez la première dose le matin ou le soir, en fonction du moment où vous récupérez votre traitement prescrit, ou selon les recommandations de votre professionnel(le) de santé.

- Avalez les comprimés en entier. Ne mâchez pas, ni ne cassez ou écrasez les comprimés.
- Prenez les comprimés avec ou sans nourriture.
- N'arrêtez pas de prendre le Paxlovid sans en parler à votre professionnel(le) de santé, même si vous vous sentez mieux.

Si vous oubliez de prendre une dose de Paxlovid dans les huit heures suivant l'heure habituelle de prise, prenez-la dès que vous vous en souvenez. Si vous oubliez une dose pendant plus de huit heures, sautez cette dose oubliée et prenez la dose suivante à l'heure habituelle. Ne prenez pas deux doses de Paxlovid en même temps. Si vous prenez trop de Paxlovid, appelez votre professionnel(le) de santé ou rendez-vous immédiatement au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Adressez-vous à votre professionnel(le) de santé si vous commencez à vous sentir moins bien ou si vous ne vous sentez pas mieux après cinq jours. Si vous vous sentez mieux, mais que vous recommencez à vous sentir moins bien à tout moment après avoir terminé votre traitement par Paxlovid, parlez-en à votre professionnel(le) de santé et répétez le test de dépistage de la COVID-19.

Si vous prenez certains médicaments, votre professionnel(le) de santé pourra vous recommander d'interrompre ou d'ajuster la dose pendant une courte période. Les patientes prenant des contraceptifs hormonaux combinés (pilules contraceptives) doivent prévoir d'utiliser une méthode de secours. Discutez avec votre professionnel(le) de santé des autres méthodes de prévention de la grossesse et des instructions d'utilisation lors de la prise de Paxlovid.

En général, qui ne doit pas prendre de Paxlovid ? Ne prenez jamais de Paxlovid si :

- Vous êtes allergique au nirmatrelvir, au ritonavir ou à l'un des composants contenus dans le Paxlovid.
- Vous êtes enceinte, prévoyez de débiter une grossesse ou allaitez.*
- Vous êtes atteint(e) d'une maladie rénale ou hépatique avancée (sévère).
- Vous ne présentez pas de risque de maladie grave, d'hospitalisation ou de décès liés à la COVID-19.
- Vous prenez certains médicaments.
Informez votre professionnel(le) de santé de tous les médicaments que vous prenez, car des analyses de laboratoire supplémentaires ou des modifications de la dose de vos autres médicaments peuvent être nécessaires pendant la prise de Paxlovid. Votre professionnel(le) de santé pourra également vous informer des symptômes spécifiques à surveiller qui peuvent indiquer que vous devez arrêter ou diminuer la dose de certains de vos autres médicaments.

* La grossesse est un facteur de risque de développer une forme sévère ou critique de la COVID-19, et les patientes enceintes doivent discuter des risques et bénéfices globaux avec leur professionnel(le) de santé avant de prendre le Paxlovid. Il n'existe actuellement aucun consensus sur la recommandation de Paxlovid pour les patientes enceintes. La FDA indique que pour une mère et un enfant à naître, le bénéfice de la prise de Paxlovid peut être supérieur au risque du traitement, compte tenu des études existantes chez l'animal et de l'utilisation importante du ritonavir chez les femmes enceintes infectées par le VIH. En revanche, l'OMS indique que la forte recommandation émise pour son utilisation ne s'applique pas aux patientes enceintes.