

## Posibles efectos secundarios importantes de paxlovid

- **Reacciones alérgicas.** Pueden presentarse reacciones alérgicas graves (conocidas como anafilaxia), incluso después de una sola dosis. Deje de tomar Paxlovid y llame a su proveedor de cuidados de la salud de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas: dificultad para tragar o respirar; hinchazón de la boca, los labios o la cara, opresión en la garganta, ronquera, erupción cutánea repentina o urticaria.
- **Problemas hepáticos.** Informe de inmediato a su proveedor de cuidados de la salud si tiene alguno de estos signos y síntomas de problemas hepáticos: pérdida del apetito, coloración amarillenta de la piel y la parte blanca de los ojos (ictericia), orina de color oscuro, heces de color pálido y picazón en la piel, dolor de estómago/abdominal.
- **Otros efectos secundarios posibles y más frecuentes** incluyen alteración del sentido del gusto, diarrea/náuseas, presión arterial alta, dolores musculares, dolor abdominal o sensación de malestar general. Estos pueden ser normales y no necesariamente un motivo para dejar de tomar Paxlovid. Comuníquese con su proveedor de cuidados de la salud si experimenta algún síntoma que le preocupe.

## Cómo cuidar de usted mismo o de un familiar con la COVID-19

- Los cuidados de soporte incluyen reposo, hidratación y nutrición. Hable con su médico sobre otros tratamientos que pueden aliviar sus síntomas (es decir, dolores de cabeza, dolores musculares, fiebre y tos) mientras se recupera de la COVID-19.
- Usted sigue siendo contagioso; permanezca aislado de acuerdo con sus pautas locales, use tapabocas si debe estar cerca de otras personas y lávese las manos con frecuencia para reducir la propagación de la COVID-19.
- La vacunación es la forma más eficaz de reducir el riesgo de infección y progresión a enfermedad grave, hospitalización y muerte. Póngase la vacuna o el refuerzo si aún no lo ha hecho.

**BANDERAS ROJAS:** Incluso si está tomando PAXLOVID, busque atención médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas de emergencia: empeoramiento de la disnea o falta de aire, dolor en el pecho intenso y constante, debilidad intensa, confusión o letargo.

### Información de contacto:

Mi equipo de atención médica: \_\_\_\_\_

Mi atención de emergencia más cercana: \_\_\_\_\_

Este trabajo fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es responsabilidad del proyecto EpiC y no necesariamente refleja las opiniones de la USAID o el gobierno de los Estados Unidos. EpiC es un acuerdo cooperativo global (7200AA19CA00002) liderado por FHI 360 con los socios principales Right to Care, Palladium International y Population Services International (PSI).

## Prueba para tratar: Cómo comenzar a tomar Paxlovid (comprimidos de nirmatrelvir y ritonavir)

La prueba para tratar es una estrategia que vincula a los pacientes sintomáticos con las pruebas, el diagnóstico y la atención basada en la evidencia para la COVID-19, incluido el uso de antivirales orales para pacientes elegibles.

Se le ha entregado esta hoja informativa porque su proveedor de cuidados de la salud considera que es beneficioso darle el medicamento antiviral oral denominado Paxlovid para el tratamiento de la enfermedad de leve a moderada por el coronavirus (COVID-19) causada por el virus SARS-CoV-2. Esta hoja contiene información para ayudarlo a comprender los riesgos y beneficios de tomar Paxlovid, que usted recibe o puede recibir. Le explica cómo tomar Paxlovid y cómo informar efectos secundarios o problemas con el aspecto o el empaque. Hable con su proveedor de cuidados de la salud si tiene alguna pregunta.

Paxlovid es fabricado por Pfizer y ha recibido la autorización de uso de emergencia de la FDA en los Estados Unidos. Paxlovid está en investigación porque aún se está estudiando. La información sobre la seguridad y la efectividad del uso de Paxlovid para tratar a personas con la COVID-19 de leve a moderada es limitada, pero los datos disponibles lo respaldan como tratamiento recomendado.

### Usted decide si debe tomar Paxlovid o no.

**¿Qué es Paxlovid?** Paxlovid es un nuevo medicamento antiviral oral utilizado para tratar la COVID-19 de leve a moderada. Pfizer lo fabrica y se le otorgó autorización de uso de emergencia como tratamiento para la COVID-19 de leve y moderada.

**¿Quién puede tomar Paxlovid?** Adultos y niños [12 años o más con un peso mínimo de 88 libras (40 kg)] con un resultado positivo en la prueba de SARS-CoV-2 y que tienen un riesgo alto de progresión a la COVID-19 grave, incluidas hospitalización o muerte.

### Debe informar a su proveedor de cuidados de la salud antes de comenzar a tomar Paxlovid



- Todos los medicamentos, suplementos, medicamentos a base de hierbas o vitaminas que esté tomando actualmente o que deba tomar.
  - Cualquier enfermedad grave o crónica.
  - Específicamente, informe a su proveedor de cuidados de la salud si tiene VIH y, de ser así, qué medicamentos está tomando
  - Cualquier alergia
  - Enfermedad renal o hepática
  - Si está embarazada o puede quedar embarazada
  - Si está en periodo de lactancia
- Si respondió "sí" a alguna de estas afecciones, informe a su proveedor de cuidados de la salud. Aún puede recibir tratamiento para la COVID-19. Hay más información dentro en este documento.*

Recomendaciones basadas en la hoja [informativa para pacientes, padres y cuidadores](#), autorización de uso de emergencia (EUA) de PAXLOVID para la enfermedad por el coronavirus (COVID-19), Pfizer, Inc.; Revisado: 26 de septiembre de 2022

## ¿Cómo tomo Paxlovid?

- **Nirmatrelvir** es un comprimido ovalado, de color rosado. La mayoría de las personas toma dos comprimidos (150 mg cada uno, 300 mg cuando se toman juntos). Las personas con problemas renales toman solo un comprimido (150 mg) por dosis. Hable con su proveedor de cuidados de la salud si tiene alguna afección médica grave para asegurarse de que esté tomando la dosis correcta.
- **Ritonavir** es un comprimido ovalado, de color blanco o blanquecino. Las personas toman un comprimido de ritonavir (100mg) por dosis.

### Cómo tomar PAXLOVID 300 mg; empaque de dosis de 100 mg

<p><b>PAXLOVID™</b> (comprimidos de nirmatrelvir, comprimidos de ritonavir), empaçados conjuntamente para uso oral <b>300 mg de nirmatrelvir, 100 mg de ritonavir</b></p> <p>Comprimido de nirmatrelvir (150 mg)</p> <p><b>Dosis matutina</b> tome 3 comprimidos al mismo tiempo.</p> <p>Comprimido de nirmatrelvir (150 mg)</p>	<p><b>Dosis matutina:</b> tome los 2 comprimidos de color rosado de nirmatrelvir y 1 comprimido de color blanco a blanquecino de ritonavir juntos a la misma hora todas las mañanas.</p> 
<p><b>PAXLOVID™</b> (comprimidos de nirmatrelvir, comprimidos de ritonavir), empaçados conjuntamente para uso oral <b>300 mg de nirmatrelvir, 100 mg de ritonavir</b></p> <p>Comprimido de nirmatrelvir (150 mg)</p> <p><b>Dosis de la noche:</b> tome 3 comprimidos al mismo tiempo.</p> <p>Comprimido de nirmatrelvir (150 mg)</p>	<p><b>Dosis de la noche:</b> tome los 2 comprimidos de color rosado de nirmatrelvir y 1 comprimido de color blanco a blanquecino de ritonavir juntos a la misma hora todas las noches.</p> 

Si tiene enfermedad renal avanzada o si su proveedor de cuidados de la salud decide que debe recibir una dosis más baja, solo puede tomar un comprimido de nirmatrelvir (150 mg) y un comprimido de ritonavir (100 mg) por dosis.

## ¿Cómo debo almacenar Paxlovid?

Almacene los comprimidos de Paxlovid a temperatura ambiente, entre 68 °F y 77 °F (20 °C y 25 °C).

Si tiene inquietudes sobre el aspecto del empaque o los comprimidos, o si tiene inquietudes sobre posibles efectos secundarios o interacciones con medicamentos, comuníquese con el proveedor de cuidados de la salud o el centro donde se le recetó Paxlovid.

## Consejos para tomar Paxlovid

No saque los comprimidos de Paxlovid del blíster antes de estar listo para tomar su dosis. Tome la primera dosis por la mañana o por la noche, según cuándo retire su receta o según lo recomiende su proveedor de cuidados de la salud.

- Trague los comprimidos enteros. No mastique, rompa ni triture los comprimidos.
- Tómelos con o sin alimentos.
- No deje de tomar PAXLOVID hasta que finalice el curso de tratamiento sin hablar con su profesional de cuidados de la salud, incluso si se siente mejor.

Si omite una dosis de PAXLOVID dentro de las 8 horas siguientes a la hora en la que la toma habitualmente, tómela tan pronto como lo recuerde. Si olvidó una dosis durante más de 8 horas, omita esta dosis y tome la siguiente a la hora habitual. No tome dos dosis de Paxlovid al mismo tiempo. Si toma demasiado PAXLOVID, llame a su proveedor de cuidados de la salud o diríjase a la sala de emergencias del hospital más cercano de inmediato.

**Hable con su proveedor de cuidados de la salud si no se siente mejor o si se siente peor después de 5 días. Si se siente mejor, pero luego comienza a sentirse peor nuevamente en cualquier momento después de finalizar el curso de Paxlovid, hable con su proveedor de cuidados de la salud y repítase la prueba de la COVID-19.**

Si toma ciertos medicamentos, es posible que su proveedor de cuidados de la salud le recomiende suspender o ajustar la dosis durante un período breve. Las pacientes que toman anticonceptivos hormonales combinados (píldoras anticonceptivas) deben usar un método de respaldo. Hable con su proveedor de cuidados de la salud sobre métodos alternativos de prevención del embarazo e instrucciones de uso cuando tome Paxlovid.

## ¿Quién generalmente no debe tomar Paxlovid? No tome Paxlovid si:

- Es alérgico al nirmatrelvir, al ritonavir o a cualquiera de los ingredientes de Paxlovid.
- Está embarazada, planifica quedar embarazada o está amamantando.\*
- Tiene enfermedad renal o hepática avanzada (grave).
- No está en riesgo de enfermedad grave, hospitalización o muerte relacionada con la COVID-19.

- Está tomando ciertos medicamentos.

*Informe a su proveedor de cuidados de la salud acerca de todos los medicamentos que está tomando porque es posible que se necesiten exámenes de laboratorio adicionales o cambios en la dosis de sus otros medicamentos mientras toma Paxlovid. Su proveedor de cuidados de la salud también puede informarle sobre los síntomas específicos a los que debe estar atento, que pueden indicar que debe interrumpir o disminuir la dosis de algunos de sus otros medicamentos.*

- \* El embarazo es un factor de riesgo para el desarrollo de la COVID-19 grave o crítica, y las pacientes embarazadas deben analizar los riesgos y beneficios generales con su proveedor de cuidados de la salud antes de tomar Paxlovid. Actualmente no existe consenso sobre la recomendación de Paxlovid para pacientes embarazadas. La FDA manifiesta que el beneficio de recibir Paxlovid para una madre y un bebé en gestación puede ser mayor que el riesgo del tratamiento, dados los estudios existentes en animales y el uso extenso de ritonavir en mujeres embarazadas con VIH. Por el contrario, la OMS afirma que su sólida recomendación de uso no se aplica a pacientes embarazadas.