

Paano nakukuha ang sakit na Schistosomiasis?

Kapag nakapasok sa balat ng tao ang cercaria ng bulateng sisto na naunang namahay sa loob ng sistong suso.

Kapag ang isang tao o hayop na may Schistosomiasis ay dumudumi sa tubigan, sila ay nagkakalat ng itlog ng bulateng sisto. Ang mga itlog ay napipisa at nagiging “miracidium” na siyang hahanap ng suso. Ang pagpasok niya sa suso ay nagdudulot ng sakit dito at maaaring ikamatay ng suso.

Sa loob ng suso, patuloy ang paglaki ng miracidium hanggang maging cercaria. Ang cercaria ay lalabas sa suso at hahanap ng panibagong matitirahan na maaaring tao o hayop sa pamamagitan ng pagpasok sa balat o “skin penetration.”

Ikumpara ang sistong suso sa butil ng bigas: Ito ay mas maliit pa sa kalahating butil ng bigas.

Paano nakukuha ang sakit na Schistosomiasis?

- Kapag nakapasok sa balat ng tao ang cercaria ng bulateng sisto na naunang namahay sa loob ng sistong suso
- Galing ang parasito sa ibang tao o hayop



Anu-ano ang mga sintomas ng sakit na Schistosomiasis?

- Pagdumi nang may bahid ng dugo
- Panghihina at paglalagnat

Ang katuloy nito ay nasa sunod na slide.

Anu-ano ang mga sintomas ng sakit na Schistosomiasis?

Pagdumi nang may bahid ng dugo



Panghihina at paglalagnat

Page 4



Anu-ano ang mga sintomas ng sakit na Schistosomiasis?

- Pagdumi nang may bahid ng dugo
- Panghihina at paglalagnat

Ang katuloy nito ay nasa sunod na slide.