



Test to Treat (Dépister et traiter) : Commencer le molnupiravir

Effets secondaires possibles du Molnupiravir

- Réactions allergiques. Des réactions allergiques sévères (appelées « anaphylaxie ») peuvent survenir, même après une seule dose. Arrêtez de prendre le molnupiravir et appelez immédiatement votre professionnel(le) de santé si vous présentez l'un des symptômes suivants : *difficultés à avaler ou à respirer ; gonflement de la bouche, des lèvres ou du visage ; serrement de la gorge ; enrouement ; éruption cutanée soudaine ou urticaire.*
- Autres effets secondaires possibles. *Les nausées, la diarrhée et les étourdissements sont les effets secondaires les plus fréquents.* Ceux-ci peuvent être normaux et ne constituent pas nécessairement une raison d'arrêter de prendre le molnupiravir. Contactez votre professionnel(le) de santé si vous présentez des symptômes qui vous inquiètent.

Prendre soin de vous ou d'un membre de votre famille atteint de COVID-19

- Les soins de soutien comprennent le repos, l'hydratation et la nutrition. Discutez avec votre médecin des autres traitements qui peuvent soulager vos symptômes (c.-à-d. maux de tête, douleurs musculaires, fièvre et toux) pendant votre rétablissement de la COVID-19.
- Vous êtes toujours contagieux(-se) ; restez isolé(e) conformément aux directives locales, portez un masque si vous devez être à proximité d'autres personnes et lavez-vous les mains fréquemment pour réduire la propagation de la COVID-19. Adressez-vous à votre équipe soignante si vous avez des questions sur l'isolement et/ou la quarantaine.
- La vaccination est le moyen le plus efficace de réduire le risque d'infection et de progression en maladie grave, en hospitalisation et en décès. Faites-vous vacciner et/ou recevez un rappel si cela n'a pas déjà été fait.

AVERTISSEMENT : même si vous prenez du molnupiravir, consultez immédiatement un médecin si vous présentez l'un des signes ou symptômes d'urgence suivants : aggravation de la respiration ou essoufflement, douleur thoracique sévère et persistante, faiblesse sévère, confusion ou léthargie.

Coordonnées :

Mon équipe soignante : _____

Mes soins d'urgence les plus proches : _____

La stratégie « Test to Treat » (dépister et traiter) permet de relier les patients symptomatiques aux tests, au diagnostic et aux soins fondés sur des preuves pour la COVID-19, y compris l'utilisation d'antiviraux par voie orale pour les patients éligibles.

Qu'est-ce que le molnupiravir ? Le molnupiravir est un nouveau médicament antiviral oral utilisé pour traiter la COVID-19 légère à modérée.

Qui peut prendre le molnupiravir ? Les adultes (âgés de 18 ans et plus) présentant un résultat positif au test de dépistage du SARS-CoV-2 dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes et qui présentent un risque élevé de progression vers une forme sévère de COVID-19, y compris une hospitalisation ou le décès.

Vous avez reçu cette fiche d'information parce que votre professionnel(le) de santé estime qu'il est bénéfique de vous fournir le médicament antiviral oral appelé molnupiravir pour le traitement de la maladie à coronavirus (COVID-19) légère à modérée causée par le virus SARS-CoV-2. Cette fiche d'information contient des informations pour vous aider à comprendre les risques et les bénéfices de la prise de molnupiravir, que vous recevez ou pourriez recevoir. Elle explique comment prendre le molnupiravir et comment signaler les effets secondaires ou les problèmes d'aspect ou d'emballage. Adressez-vous à votre professionnel(le) de santé si vous avez des questions.

Le molnupiravir a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA aux États-Unis et est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé comme traitement de la COVID-19. Le molnupiravir est considéré comme expérimental car il est encore en cours d'étude. Il existe peu d'informations sur la sécurité d'emploi et l'efficacité de l'utilisation du molnupiravir pour traiter les personnes atteintes de COVID-19 légère à modérée, mais les données disponibles l'étaient comme traitement recommandé.

Ce qu'il faut indiquer à votre professionnel(le) de santé avant de commencer à prendre le molnupiravir

- Tous les médicaments, compléments alimentaires, médicaments à base de plantes ou vitamines que vous prenez actuellement ou que vous devez prendre
- Toute maladie grave ou maladie chronique
- Toute allergie
- Grossesse en cours possible ou possibilité de débiter une grossesse
- Allaitement

Si vous avez répondu « oui » à l'un de ces états, dites-le à votre professionnel(le) de santé. Vous pouvez toujours être traité(e) pour la COVID-19. Voir à l'intérieur pour plus d'informations.

Recommandations basées sur la [fiche d'information destinée aux patients et aux soignants](#) Autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) des gélules de LAGEVRIO™ (molnupiravir) pour la maladie à coronavirus (COVID-19) ; Merck & Co., Inc ; Révisé : Juin 2022.



Comment prendre le molnupiravir ?

- Prenez quatre gélules de molnupiravir toutes les 12 heures (par exemple, à 8 h et 20 h).
- Prenez du molnupiravir pendant cinq jours. Il est important de terminer les cinq jours de traitement. N'arrêtez pas de prendre le molnupiravir avant les cinq jours complets, même si vous vous sentez mieux.
- Prenez le molnupiravir avec ou sans nourriture.
- Avalez les gélules entières. N'ouvrez pas, ne cassez pas et n'écrasez pas les gélules. Si vous ne pouvez pas avaler les gélules entières, informez-en votre professionnel(le) de santé.

Conseils pour la prise de molnupiravir

Que faire si vous oubliez une dose : Si moins de 10 heures se sont écoulées depuis la dose oubliée, prenez-la dès que vous vous en souvenez. Si plus de 10 heures se sont écoulées depuis la dose oubliée, sautez la dose oubliée et prenez votre dose à l'heure prévue suivante. Ne doublez pas la dose de molnupiravir pour compenser une dose oubliée.

Adressez-vous à votre professionnel(le) de santé si vous commencez à vous sentir moins bien ou si vous ne vous sentez pas mieux après cinq jours. Si vous vous sentez mieux, mais que vous recommencez à vous sentir moins bien à tout moment après avoir terminé votre traitement par molnupiravir, parlez-en à votre professionnel(le) de santé et répétez le test de dépistage de la COVID-19.

Comment conserver le molnupiravir

Conservez les gélules à température ambiante entre 20 °C et 25 °C. Conservez le molnupiravir et tous les médicaments hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

Si vous avez des inquiétudes concernant l'apparence de l'emballage ou des comprimés, ou si vous avez des inquiétudes concernant des effets secondaires ou des interactions médicamenteuses possibles, contactez le ou la professionnelle de santé ou l'établissement où vous avez reçu le molnupiravir.



800 mg (soit QUATRE GÉLULES de 200 mg)

Images de gélules à des fins d'illustration uniquement.



PAR VOIE ORALE TOUTES LES 12 HEURES



PENDANT 5 JOURS



AVEC OU SANS NOURRITURE

En général, qui ne doit pas prendre de molnupiravir ?

- Vous êtes allergique à l'un des composants du molnupiravir.
- Vous êtes enceinte, prévoyez de débiter une grossesse ou allaitez.
- Vous ne présentez pas de risque de maladie grave, d'hospitalisation ou de décès liés à la COVID-19.
- Vous prenez certains médicaments.

Quelles sont les informations les plus importantes que je dois connaître à propos du molnupiravir ?

L'utilisation du molnupiravir n'est pas recommandée pendant la grossesse. On ne sait pas si le molnupiravir sera nocif pour votre bébé s'il est pris pendant la grossesse. Le molnupiravir n'a pas été étudié chez la femme enceinte. Lorsqu'il a été étudié chez des animaux gravides, le molnupiravir a causé des effets nocifs à l'enfant à naître.



Pour les femmes pouvant débiter une grossesse :

- Utilisez une méthode de contraception fiable de manière constante et correcte pendant le traitement par molnupiravir et pendant quatre jours après la dernière dose. Discutez avec votre professionnel(le) de santé des méthodes de contraception fiables.
- Avant de commencer le traitement par molnupiravir, votre professionnel(le) de santé pourra effectuer un test de grossesse pour déterminer si vous êtes enceinte. *Informez immédiatement votre professionnel(le) de santé si vous débutez une grossesse ou si vous pensez être enceinte pendant le traitement par molnupiravir.*
- L'allaitement n'est pas recommandé pendant le traitement par molnupiravir et pendant quatre jours après la dernière dose. Si une personne allaite, il est possible d'envisager d'interrompre l'allaitement, de pomper et de jeter le lait pendant le traitement et pendant quatre jours après la dernière dose.*

Pour les hommes sexuellement actifs dont les partenaires sont en mesure de débiter une grossesse :

- On ne sait pas si le molnupiravir peut avoir un effet sur le sperme. Bien que le risque soit considéré comme faible, les études chez l'animal visant à évaluer pleinement le potentiel du molnupiravir à affecter les bébés conçus par des hommes traités par molnupiravir n'ont pas été achevées. Une méthode de contraception fiable doit être utilisée régulièrement et correctement pendant le traitement par molnupiravir et pendant au moins trois mois après la dernière dose. Adressez-vous à votre professionnel(le) de santé si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la contraception ou la façon dont le molnupiravir peut affecter le sperme.